



PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

RECOMENDACIONES DE RASTREO

María Rezzónico
Médica de familia
3 de Agosto 2012

RASTREO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

1. ¿Qué dicen las recomendaciones actuales?
2. ¿Cuál es el debate actual?
3. ¿El rol del médico de atención primaria?




RASTREO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

2009  2012

- ◉ La Fuerza de Tareas Preventiva de EEUU (USPTF) y su par Canadiense (CTFPHC)
- ◉ *Ann Intern Med.* 2012;156:880-891

RASTREO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

1. Edad para iniciar el rastreo
2. Edad para finalizar el rastreo
3. Pruebas de rastreo
4. El intervalo adecuado entre los controles



Historia
sexual de
la mujer



Población:

- NO expuestas intraútero a Dietil-etilbestrol
- Inmunocompetentes
- Sin antecedentes de H-SIL

RASTREO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Recomendaciones tipo A:

1. Rastreo de mujeres entre 21-65 años con citología (pap), cada 3 años.
2. Rastreo de mujeres entre 30 y 65 años, con pap + test de HPV, cada 5 años.



Maximizar beneficios y
disminuir daños

RASTREO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Intervalo recomendado:

Edad	Recomendación para realizar citología
≤21 años	No realizar
21-65 años	Cada 3 años
30-65 años	Cada 3 años o cada 5 años co-testing
A los 65 años	Finalizar

Mujeres con 3 citologías consecutivas negativas, ausencia patología 10 años y pareja estable


RASTREO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

- ◉ Las mujeres tratadas por CIN 2, CIN 3 o cáncer continúan siendo un grupo de riesgo y deben continuar controles por 20 años. (Recomendación tipo B)
- ◉ Las mujeres que han recibido vacuna contra el VPH 16 y VPH 18 deben realizar mismo esquema de rastreo que las NO vacunadas. (Recomendación tipo C)

RASTREO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

○ Epidemiología

Gráfico 2. Mortalidad por cáncer en mujeres. Distribución relativa de las principales localizaciones. Argentina, 2008.



•Cifras corregidas teniendo en cuenta el porcentaje de defunciones por cáncer de útero, sitio no especificado.


Fuente: "Análisis de la Situación del Cáncer en la Argentina". INC, Ministerio de Salud de la Nación.
Disponible en: http://www.msal.gov.ar/inc/equipos_analisis.asp

5ta. Causa

MUJERES JÓVENES


RASTREO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Tasa de mortalidad estandarizada por edad,
por cáncer de cuello de útero.
Jurisdicciones argentinas y países seleccionados.³



Fuente: jurisdicciones argentinas (2003-2005): elaboración propia en base a datos proporcionados por la DEIS, Ministerio de Salud; otros países (2002): Ferlay *et al.* 2004.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUERTES POR CCU, POR GRUPO DE EDAD



Fuente: DEIS, Ministerio de Salud

CONCLUSIONES



- Datos dinámicos
- Validez externa
- Inequidad en Salud Argentina

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN



Lograr amplia cobertura del rastreo

Ofrecer prueba eficaz y aceptable

Garantizar que las mujeres con pruebas positivas reciban el tratamiento adecuado

Estrategia: búsqueda activa



LAS DOS NECESITAN UN PAP

El cáncer de cuello de útero afecta especialmente a las mujeres mayores de 35 años.

El **Papanicolaou** o **PAP** en forma periódica ayuda a prevenirlo.

Es una prueba sencilla, no produce dolor y dura sólo unos minutos.


El **PAP** es gratuito.

Si tenés 35 años o más, acercate al Hospital o centro de salud más cercano y consultá.



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN DEL CCU



BIBLIOGRAFÍA

- ◉ “Análisis de la Situación del Cáncer en la Argentina”. INC, Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: http://www.msal.gov.ar/inc/equipos_analisis.asp
- ◉ Instituto Nacional del Cáncer, Ministerio de Salud. http://www.msal.gov.ar/inc/equipos_analisis.asp
- ◉ Ciapponi A. Actualización y combinación de las guías de cuidados preventivos de las fuerzas de tareas de EE.UU. y Canadá (cuarta parte). Evid Act Pract Ambul. 13(1). 20-25. Ene-mar 2010.
- ◉ ACOG Practice Bulletin. Cervical Cytology Screening. Obstetrics & Gynecology: December 2009 - Volume 114 - Issue 6 - ppg 1409-1420
- ◉ Arrossi, S. Paolino, M. Proyecto para el mejoramiento del Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino en Argentina. Buenos Aires, diciembre 2007. (Revisión junio 2008).
- ◉ Virginia A. Moyer, MD, MPH. Screening for Cervical Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. 2012;156:880-891.